BIORITMON C

Dompé

Bioritmon® C è un integratore alimentare a base di Vitamina C (500 mg). La Vitamina C svolge un ruolo importante per le funzioni fisiologiche del nostro organismo. Essa è coinvolta in una vasta gamma di processi biologici fondamentali per la salute e il benessere.

Contribuisce alla normale funzione del **sistema immunitario**, fondamentale per affrontare i disturbi legati alla **stagionalità**. Contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno **sforzo fisico intenso**.

Possiede un'elevata capacità **antiossidante** che permette di neutralizzare i radicali liberi: quando presenti in quantità elevate, possono arrecare danni al nostro organismo, rappresentando una delle cause primarie che concorrono all'invecchiamento dei tessuti. L'inquinamento atmosferico, il fumo e una dieta scorretta contribuiscono ad aumentare la produzione interna di radicali liberi e quindi aumentano il fabbisogno di Vitamina C. In aggiunta, la Vitamina C contribuisce alla rigenerazione della forma ridotta della Vitamina E, concorrendo alla protezione dallo stress ossidativo.

Supporta il normale **metabolismo energetico** e riduce il livello di **affaticamento e stanchezza.**

Contribuisce al buon funzionamento del **sistema nervoso** e alla **funzione psicologica**.

Supporta la normale formazione di **collagene**, proteina essenziale per la funzione di ossa, cartilagini, pelle, vasi sanguigni, denti e gengive, risultando così utile in tutti i disturbi legati alla sua perdita.

Accresce l'**assorbimento del Ferro** e pertanto è particolarmente indicata in caso di aumentato fabbisogno, come ad esempio nella donna **durante il periodo fertile**, in **gravidanza** e durante l'**allattamento**, quando la concentrazione del Ferro nel sangue può diminuire.

INGREDIENTI

Saccarosio; Vitamina C (L-ascorbato di sodio); Vitamina C (acido L-ascorbico); Aromi; Stabilizzanti: idrossipropilmetilcellulosa; Coloranti: concentrato di carota arancione, concentrato di barbabietola rossa; Agenti antiagglomeranti: Sali di Magnesio degli acidi grassi, Biossido di silicio; Edulcoranti: Sucralosio, acesulfame K.

GUSTO ARANCIA
Senza glutine e senza lattosio.

CONTENUTI MEDI

Componenti	Per 1 compressa masticabile	Per 2 compresse masticabili	%VNR*/ compressa
Vitamina C	**500 mg**	**1000 mg**	**625**

*** VNR:** Valori Nutritivi di Riferimento (Reg. UE 1169/2011)

MODALITÀ D'USO

Si consiglia di assumere 1-2 compresse masticabili al giorno.

AVVERTENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d'età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Conservare ad una temperatura non superiore a 25°; evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e il contatto con l'acqua. La data di fine validità si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

CONFEZIONE
Astuccio da 20 compresse masticabili (1,8 g ciascuna).
Peso netto: 36 g

Prodotto e confezionato nello stabilimento di
Via L. Ariosto 50/60 - Trezzano sul Naviglio (MI)
Per conto di Dompé farmaceutici S.p.A.
Via San Martino 12 - 20122 Milano

BIORITMON C

Dompé

Per mantenere un corretto e adeguato livello di Vitamina C, essenziale per le normali funzioni dell'organismo, è talvolta opportuno utilizzare integratori alimentari che apportino la giusta quantità di Vitamina C.
Sebbene la Vitamina C si trovi in diverse fonti alimentari, determinare se la quantità contenuta sia sufficiente per soddisfare il fabbisogno può essere complesso, e ciò è dovuto a diversi fattori.

ABITUDINI ALIMENTARI

Molte persone non consumano abbastanza frutta e verdura fresca nella loro dieta quotidiana per raggiungere il fabbisogno raccomandato.

PERDITA DI VITAMINA C DURANTE LA CONSERVAZIONE E PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI

La Vitamina C è sensibile al calore, all'aria e alla luce. La cottura e la conservazione prolungata degli alimenti possono ridurne significativamente il contenuto. Ad esempio, la cottura delle verdure può causare una perdita di Vitamina C, mentre l'esposizione prolungata all'aria può ossidare quella presente nei frutti.

AUMENTATO FABBISOGNO

In alcune situazioni, il fabbisogno di Vitamina C può aumentare. Ad esempio, durante periodi di stress, convalescenza, gravidanza, allattamento al seno, o in tutte le condizioni in cui è necessario sostenere il sistema immunitario e altri processi fisiologici.

ASSORBIMENTO INEFFICIENTE

Anche se si consumano cibi ricchi di Vitamina C, l'assorbimento può essere influenzato da differenti fattori, come l'età, lo stato di salute, l'assunzione di farmaci e l'equilibrio della flora intestinale. Inoltre, la maggior parte della Vitamina C assunta viene poi velocemente eliminata attraverso il sudore e le urine.

030121168/2

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Foglio Illustrativo PAP 22	CARTA
Blister C/PVC 90	PLASTICA

Verifica sempre le disposizioni del tuo comune